


Circovirusul Porcin Tip-2 (PCV-2)

Reprezintă, în prezent, una dintre cele mai devastatoare boli care afectează fermele de porci din toată lumea.

Boala (PCVD) este, în general, asociată cu:



01
Întârzieri în creștere:
(reducerea parametrilor de creștere)



02
Mortalitate
De la **4%** | Până la **20%**



03
Pierderi productive
La porcii în creștere și la finisare

IMPACT ENORM

Costul bolii a fost estimat a avea o valoare între:



între

562€ și 900€ milioane

pe an în UE



Scădere în greutate foarte vizibilă la porcii afectați, dar se poate manifesta și ca:

Parte a complexului bolilor respiratoria porcine (PRDC)

O boală enenerică

Un sindrom care afectează pielea și rinichii (PDNS)



Rată mare a mortalității

Tulburări reproductive

O formă subclinică
(doar un mic grad de întârziere în creștere)

Puncte cheie pentru recunoașterea PCVD:

01

Porcii nu cresc și continuă să slăbească.

03

Porcii afectați sunt letargici și rămân în urma celorlalți.

05

Stres respirator, diaree, limfonoduri periferice mărite și lipsa răspunsului la antibioterapie.

02

Dimensiuni diferite ale animalelor din țarcuri.

04

Porcii prezintă păr aspru și piele palidă, câteodată icterică.



Este o boală lentă și progresivă prezentă în aproape toate fermele de porci.

Cum putem controla boala?



CONTROLUL COINFECTIILOR:
alți patogeni pot declanșa PCVD, precum parvovirusul porcine (PVP) și PRRSV.



MANAGEMENT:
Urmând cele "20 de puncte Madec".



MEDIU:
Controlul ventilației, al temperaturii și al umidității.



BIOSECURITATE
(PCV-2 este un virus foarte rezistent) care se transmite prin fecale sau obiecte contaminate (echipamente, cizme, vehicule).



VACCINARE:
Solicitați asistență din partea veterinarului dumneavoastră.